

Menge, Myr. der Umg. von Danzig, p. 9.
Stuxberg, Sverig. Chilog., 906.

Polydesmus parvulus nov. sp.

Colore del corpo pallido biancastro e ferrugineo. — Carene poco rilevate. — Tre serie di tubercoletti, tutti pressochè uguali in ogni scudo, invadono anche le carene. — Il secondo scudo non carenato, ai lati è appuntito, e porta due sole serie di tubercoli.

Questa specie, che do come non ancora descritta, apparterebbe al genere *Scytonotus* di Koch, e precisamente alla specie *laevicollis* dello stesso Autore. Io non so per quali caratteri esso debbasi staccare dal genere *Polydesmus* di Brandt. Per ciò che riguarda le due specie trovo le seguenti differenze: la statura è molto più piccola negli individui da me descritti; il secondo segmento, nel *laevicollis*, possiede soltanto cinque tubercoletti; il colore è anche diverso.

Qualche somiglianza la trovo anche col *Polydesmus granosus* di Humbert et Saussure, ma il segmento preanale termina, in quest'ultimo, in forma di piastretta larga, mentre nel *parvulus* finisce in punta.

Lunghezza totale del corpo mill. 8-10

Secondo Genere: *Strongylosoma* Brandt.

I segmenti del corpo che sono in uguale numero come nei Po-